ステップ名称		術前	手術日		術後1-2日目		術後3-5日目		
		1日前	基準日		1日後	2日後	3日後	4日後	5日後
		手術前日	手術当日（術前）	手術当日（術後）	術後１日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目
アウトカム									
観察項目									
検査結果									
医師指示		バイタル測定(2検)	最終水分6時まで	最終水分6時まで	バイタル測定（3検）	バイタル測定（3検）	バイタル測定(2検)	バイタル測定(2検)	バイタル測定(2検)
		清潔（入浴可）	最終水分10時まで	最終水分10時まで	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）
		安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	バイタル測定	バルーン抜去	清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）
		中止指示薬確認	DVT予防（弾性ストッキング）	DVT予防（弾性ストッキ	DVT予防（弾性ストッキ	食事			
				安静度（ベッド上フリー）	持参薬再開確認				
				手術室で尿道バルーン挿入	飲水許可				
				血圧≧180の時	尿量測定	尿量測定			
				血圧≦80mmHgの時					
				尿量減少時					
				帰室後モニター装着。 翌日回診後除去。					
				酸素指示 手術翌日、回診後中止。	酸素指示 手術翌日、回診後中				
				DVT予防（ベナフロー）					
検査	検体検査				血液検査		血液検査		血液検査
	画像検査			術後レントゲン撮影	ポータブル撮影		レントゲン撮影		レントゲン撮影
	生理検査								
	その他								
処方	内服	下剤内服				ピオスリー、モサプリドクエン酸塩、			
	外用								
注射薬			術前点滴（手術が午後の時）	点滴	点滴	点滴	点滴		
				抗生剤点滴					
治療	治療								
	処置	切毛、臍処置							
	手術		手術						
リハビリ		リハビリオーダー							
食事		昼食以後絶食	絶食（指示まで水分可）	絶飲食	飲水可	極軟菜食	軟菜食	並食	
カルテ									
指導・説明	医師								
	看護師	同意書確認（手術・麻酔・輸血・特定 生物由来）	コンプリネット装着 点検事項（義歯・ぐらつく歯・補聴器 ・時計・貴重品・指輪・化粧・眼鏡・ コンタクト・ネームバンド・爪切り・	肺血栓塞栓予防管理料					
		入院時オリエンテーション 術前オリエンテーション（最終水分・ 排尿の説明と準備・術後尿測の説明準 備） 弾性ストッキング測定							
	薬剤師	服薬指導							
	その他							栄養指導	
観察	観察	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気
				出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス
				創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検
				疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）
観察	モニター								
	活動								
	清潔	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換
					清拭	シャワー浴	シャワー浴	シャワー浴	シャワー浴
	排泄			バルンカテーテル留置	バルンカテーテル抜去				
	実施事項								
	看護記録(熱型表)								
転倒転落									
NST									
褥瘡									
インシデント									
文書		入院診療計画書							
その他									
条件付き指示		尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時
		低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
		生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴
		血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時
		血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時
		疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時
		嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時
		せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
		便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
		腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛
		軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類
		ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ

術後6日目-退院

6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後
術後6日目	術後7日目	術後8日目	術後9日目	術後10日目	術後11日目
バイタル測定(2検)	バイタル測定(2検)	バイタル測定(2検)	バイタル測定(2検)	バイタル測定(2検)	バイタル測定(2検)
安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）	安静度（院内フリー）
清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）	清潔（シャワー可）
	退院許可				
	退院指導				
	服薬指導				
肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気	肺エア入り 腹鳴 腹痛 嘔気
出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス	出血(創部) 疼痛 発赤 嘔吐 排ガス
創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検
疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）	疼痛（NRS）
シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換
シャワー浴	シャワー浴	シャワー浴	シャワー浴	シャワー浴	シャワー浴
尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時
低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴	生食ロック・点滴
血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時
血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時	血圧低下時
疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時	疼痛・発熱時
嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時
せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時	せん妄時
不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛
軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類	軟膏類
ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ	ヘパフラッシュ