ステップ名称		（前日）乳房切除術パス									
		1日前	基準日		1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後
		手術前日	手術当日（術前）	手術当日（術後）	術後１日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目	術後8日目
アウトカム												
観察項目												
検査結果												
医師指示		看護指示	看護指示	看護指示	看護指示	看護指示	看護指示	看護指示	看護指示	看護指示	看護指示	看護指示
		院内フリー	院内フリー	ベッド上フリー	院内フリー	院内フリー	院内フリー	院内フリー	院内フリー	院内フリー	院内フリー	院内フリー
		入浴可	清拭	清拭	清拭	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可
		トイレ歩行可	トイレ歩行可	手術室で尿道バルーン挿入	回診後、バルーン抜去。 トイレ歩行可。	トイレ歩行可	トイレ歩行可	トイレ歩行可	トイレ歩行可	トイレ歩行可	トイレ歩行可	トイレ歩行可
				帰室後モニター装着。 翌日回診後除去。	帰室後モニター装着。 翌日回診後除去。				退院許可	退院許可	退院許可	退院許可
				酸素投与：5L/分マスクまたは3L/分経 鼻。Sp02　95以上なら酸素オフで	酸素投与：5L/分マスクまたは3L/ 分経鼻。Sp02　95以上							
				術後3時間後より水分可、それに伴い内								
検査	検体検査											
	画像検査											
	生理検査											
	その他											
処方	内服		手術当日内服薬指示		ロキソニン、レバミピド開始							
					持参薬再開指示	持参薬再開指示	持参薬再開指示	持参薬再開指示	持参薬再開指示	持参薬再開指示	持参薬再開指示	持参薬再開指示
	外用	持参薬続行・抗凝固薬中止確認。										
注射薬				点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴
治療	治療			ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引	ドレーン持続吸引
					ドレーン管理	ドレーン管理	ドレーン管理	ドレーン管理	ドレーン管理	ドレーン管理	ドレーン管理	ドレーン管理
	処置	切毛	弾性ストッキング着用。 歩行可能となれば中止可。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。	弾性ストッキング着用。
							ドレーン抜去可					
	手術		手術									
リハビリ						上肢リハビリ	上肢リハビリ	上肢リハビリ	上肢リハビリ	上肢リハビリ	上肢リハビリ	上肢リハビリ
食事			最終水分6時まで									
			最終水分10時まで	術後３時間後から水分可。								
		夕食以後絶食	絶飲食		食事開始（普通食）	普通食						
カルテ												
指導・説明	医師											
	看護師	術前オリエンテーション（最終水分・ 排尿の説明と準備・術後尿測の説明準 備） 弾性ストッキング測定 術後物品確認	コンプリネット装着 点検事項（義歯・ぐらつく歯・補聴器 ・時計・貴重品・指輪・化粧・眼鏡・ コンタクト・ネームバンド・爪切り・						退院指導	退院指導	退院指導	退院指導
		同意書確認（手術・麻酔）										
	薬剤師											
	その他											
観察	観察	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ	嘔気 しびれ
				術後バイタル測定 帰室時 30分後 1時間後 2時間後 以後2時間毎に測定								
				肺エア入り 肺雑音	肺エア入り 肺雑音	肺エア入り 肺雑音						
				出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫	出血(創部) 疼痛 ドレーン排液色調 浮腫
				創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検	創部点検
観察	モニター											
	活動	安静度フリー		（術後）ベッドアップフリー	歩行可	安静度フリー						
	清潔	入浴			全身清拭	全身清拭	全身清拭	全身清拭	全身清拭	全身清拭	全身清拭	全身清拭
		シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換	シーツ交換
	排泄			バルンカテーテル留置	バルンカテーテル抜去							
	実施事項											
	看護記録(熱型表)											
転倒転落				転倒転落リスクアセスメント評価入								
NST												
褥瘡				褥瘡リスクアセスメント評価入力								
インシデント												
文書												
その他												
条件付き指示		術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時	術前・疼痛時
		術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時	術前・発熱時
		術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時	術前・不眠時
		術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時	術前・嘔気時
		術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時	術前・便秘時
		生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック
		術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時	術後・疼痛時
		術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時	術後・発熱時
		術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時	術後・不眠時
		術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時	術後・嘔気時
		生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック	生食ロック
		便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
		腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛	腰痛・肩痛
		掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ	掻痒時ベナ
		発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット	発熱時血液培養セット
		３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入	３剤吸入