ステップ名称		治療前日	治療当日	治療当日（治療前）	治療当日	治療後1日目	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目	治療後5日目
		1日目	2日目			3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
			治療前	治療前（朝絶食）	治療後					
アウトカム										
観察項目										
検査結果										
医師指示		院内フリー	院内フリー		帰室後3時間までベッド上安静。バイタ ルサイン異常なければ安静解除後ト	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー
		検温2検				清拭可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可
		入浴可	出棟前検温		帰室時、1時間、2時間、3時間	検温2検	検温2検	検温2検	検温2検	検温2検
		治療日の内服（Dr確認）	水分出棟3時間前まで可。	午前の場合、内服6時	帰室後3時間飲水食事不可。バイタル異 常なければ飲水再開可。食事夕より					
検査	検体検査					採血（血算、生化学）				
	画像検査									
	生理検査									
	その他									
処方	内服				中止薬の再開確認					
	外用									
注射薬			ソルデム3A５００		セファゾリン１ｇ+生食100ml（帰室時 、２０時）	セファゾリン１ｇ+生食100ml（１０時 、２０時）	セファゾリン１ｇ+生食100ml（１０時 、２０時）			
治療	治療									
	処置		ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ							
	手術									
リハビリ										
食事				朝絶食	夕から食事再開					
カルテ										
指導・説明	医師									
	看護師	入院ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ								
		ラジオ波オリエンテーション								
	薬剤師									
	その他		出棟時間の確認							
観察	観察	気分不快			疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）
		膨満感（腹部）			疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）
		嘔気			嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐
					出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）
					冷汗	冷汗	冷汗	冷汗		
					悪寒	悪寒	悪寒	悪寒		
観察	モニター									
	活動		移動ケア		移動ケア					
	清潔	清潔ケア				清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア
							清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア
	排泄									
	実施事項	同意書確認 誤認防止確認								
		治療日の内服説明								
		看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬
		内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助
		内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認
	看護記録(熱型表)									
転倒転落										
NST										
褥瘡										
インシデント										
文書										
その他										
条件付き指示		不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠
		不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠
		不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠
		発熱疼痛時ロキソプロフェン+レバミピ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ
		発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠	発熱疼痛時カロナール２錠
		発熱疼痛時ポルタレン坐25	発熱疼痛時ポルタレン坐	発熱疼痛時ポルタレン坐	発熱疼痛時ポルタレン坐	発熱疼痛時ポルタレン坐	発熱疼痛時ポルタレン坐	発熱疼痛時ポルタレン坐	発熱疼痛時ポルタレン坐	発熱疼痛時ポルタレン坐
		疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注	疼痛時ペンタジン0.5A静注
		嘔気時プリンペラン１A　静注	嘔気時プリンペラン１A静注	嘔気時プリンペラン１A静注	嘔気時プリンペラン１A静注	嘔気時プリンペラン１A静注	嘔気時プリンペラン１A静注	嘔気時プリンペラン１A静注	嘔気時プリンペラン１A静注	嘔気時プリンペラン１A静注
		血圧１８０/１００以上ニカルピン静注	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ
		生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ

治療後6日目	治療後7日目	治療後8日目	治療後9日目	治療後10日目	治療後11日目	治療後12日目	治療後13日目	治療後14日目
8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	15日目	16日目
病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー	病棟内フリー
シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可	シャワー可
検温2検	検温2検	検温2検	検温2検	検温2検	検温2検	検温2検	検温2検	検温2検
	退院許可	退院許可	退院許可	退院許可	退院許可	退院許可	退院許可	退院許可
疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）	疼痛（穿刺部）
疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）	疼痛（腹部）
嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐
出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）	出血（穿刺部）
清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア
清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア
看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬	看護師管理薬
内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助	内服介助
内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認	内服確認
不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠	不眠時アモバン1錠
不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠	不眠時レンドルミン1錠
不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠	不眠時トリアゾラム1錠
発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ	発熱疼痛時ロキソプロフェン+レ
発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２	発熱疼痛時カロナール２
発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐	発熱疼痛時ボルタレン坐
疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静	疼痛時ペンタジン0.5A静
嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A	嘔気時プリンペラン１A
血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ	血圧１８０/１００以上ニカルピ
生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ	生食シリンジ